



COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 05
27/04/2016

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)(AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO; SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)

BOLLA

IN PRESENZA DI RISCHIO INFEZIONI SI CONSIGLIA DI RINNOVARE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

DODINA (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ; EFFICACE ANCHE PER CORINEO)



ALBICOCCO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

GEOMETRIDI

SI SEGNALANO ATTACCHI SPORADICI: IN TALI SITUAZIONI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

MELO

(FINE FIORITURA)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

AFIDE GRIGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, TERMINATA LA FASE DI FIORITURA, (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO) CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)



MELO (FINE FIORITURA)

TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON **PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:**

DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

PROPINEB (VARI) (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)(COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

PERO (ALLEGAGIONE-INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

VEDI INDICAZIONI PER IL MELO

SI RICORDA CHE IN FASE DI FIORITURA I TRATTAMENTI SONO CONSENTITI SOLAMENTE A SEGUITO DI DEROGA REGIONALE

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

