



COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 07
25/05/2016

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

OIDIO

SI SEGNALE ELEVATO RISCHIO D'INFEZIONE, PER CUI SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO (VEDI BOLLETTINI PRECEDENTI):

CYDIA MOLESTA

A SEGUITO DEL PRECEDENTE BOLLETTINO, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,5 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)
EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)
INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO)
FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO)

segue

CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO) (A SEGUITO DELLA MODIFICA DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DEL P.A. A LIVELLO EUROPEO, INTERVENIRE SOLO SULLE VAR. MEDIO PRECOCI CHE VANNO CIOÈ IN RACCOLTA/COMMERCIALIZZAZIONE ENTRO IL 10 AGOSTO)
COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 4 INTERVENTI CON FOSFORGANICI





CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

IN PRESENZA DI ATTACCHI DIFFUSI (SI CONSIGLIA IN TALI CASI L'ASPORTAZIONE DEI GETTI COLPITI), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO (VEDI BOLLETTINI PRECEDENTI)



MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

VISTE LE RECENTI PRECIPITAZIONI, SI RICORDA CHE E' NECESSARIO MANTENERE LA COPERTURA CONTRO LE TICCHIOLATURA DELLE POMACEE, IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (750 G./HA) (DELAN 70WG) .)(COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG

OPPURE

DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

PER CHI NON FOSSE RIUSCITO AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE AGGIUNGENDO AI PRODOTTI DI COPERTURA, I PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVI)

(MICLOBUTANIL (2 INT/ANNO), FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO (2 INT/ANNO), IL DIFENOCONAZOLO: 96 ORE DI RETROATTIVITA', PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

BUTTERATURA AMARA

NEI MELETI SOGGETTI A TALE FISIOPATIA, SI RICORDA CHE È CONSIGLIABILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI **CALCIO**.

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'AVANZAMENTO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE* (INTREPID)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI RICAMATORI**



SUCCESSIVAMENTE OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

SI RICORDA CHE A SEGUITO DELLA MODIFICA DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DEL A LIVELLO EUROPEO, IN TALE FASE FENONOLOGICA **NON È PIÙ POSSIBILE INTERVENIRE CON CLOPPIRIFOS ETILE**.

SUSINO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

PERO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

VEDI INDICAZIONI PER IL MELO

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. **NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

