



## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 08**  
10/06/2016

### **PESCO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### **OIDIO**

VISTO L'ELEVATO RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

**QUINOXIFEN (ARIUS) T.C.14 GG (MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO)**

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD) T.C.14 GG**

OPPURE

**ZOLFO BAGNABILE (VARI) T.C.5 GG**

OPPURE

**PROPICONAZOLO\* (VARI) T.C.14 GG (AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO; SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)**

OPPURE

**FENBUCONAZOLO\* (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)**

\*(CON IBE AL MASSIMO 4 INT/ANNO)

### **PESCO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### **CYDIA MOLESTA**

I DATI DEI MONITORAGGI E DEI MODELLI PREVISIONALI DICONO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DEL SECONDO VOLO: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE (INTREPID) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INTERVENTI)**

OPPURE

**CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)  
(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)**





## CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX** (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

**FOSMET** (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### OIDIO

IN PRESENZA DI ATTACCHI DIFFUSI (SI CONSIGLIA IN TALI CASI L'ASPORTAZIONE DEI GETTI COLPITI), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO (VEDI BOLLETTINI PRECEDENTI)

## MELO/PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

VISTE LE RECENTI PRECIPITAZIONI, SI RICORDA CHE E' NECESSARIO MANTENERE LA COPERTURA CONTRO LE TICCHIOLATURA DELLE POMACEE, IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

**DITHIANON (750 G./HA) (DELAN 70WG) .)(COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)**

OPPURE

**FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C.60GG**

OPPURE

**DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)**

PER CHI NON FOSSE RIUSCITO AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE AGGIUNGENDO AI PRODOTTI DI COPERTURA, I **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA A BASE DI:**

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVI)**

(MICLOBUTANIL(2 INT/ANNO), FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO (2 INT/ANNO), IL **DIFENOCONAZOLO: 96 ORE DI RETROATTIVITA'**, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

## CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO IN FASE LARVALE AVANZATA (FINE) DELLA I GENERAZIONE, PER CUI PER CHI NON FOSSE INTERVENUTO CON I FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA OPPURE IN PRESENZA DI DANNI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)**

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)**

SI RICORDA CHE A SEGUITO DELLA MODIFICA DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DEL A LIVELLO EUROPEO, IN TALE FASE FENOLOGICA NON È PIÙ POSSIBILE INTERVENIRE CON CLOPPIRIFOS ETILE.

## SUSINO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

### CYDIA FUNEBRANA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.**

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.**

OPPURE

**SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**