



COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 09
23/06/2016

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI-MATURAZIONE)**

OIDIO

VISTO L'ELEVATO RISCHIO D'INFEZIONE, NELLA VARIETÀ TARDIVE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN (ARIUS) T.C.14 GG (MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C. 14 GG

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI) T.C.5 GG

OPPURE

PROPICONAZOLO* (VARI) T.C.14 GG (AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO; SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)

OPPURE

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

***(CON IBE AL MASSIMO 4 INT/ANNO)**

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI-MATURAZIONE)**

CYDIA MOLESTA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA)



ALBICOCCO-PESCO

(INGROSSAMENTO FRUTTI-MATURAZIONE)

MONILIA

VISTE LA DELICATA FASE FENOLOGICA IN SITUAZIONI A RISCHIO, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

CIPROCONAZOLO (GALEO, T.C. 3 GG) (MASSIMO 2INT/ANNO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO, 4 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID + PYRACLOSTROBIN (BELLIS DRUPACEE) T.C.3 GG.
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

SI SEGNA LA PRESENZA DI ATTACCHI DIFFUSI (SI CONSIGLIA IN TALI CASI L'ASPORTAZIONE DEI GETTI COLPITI), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTOIDICO SPECIFICO (VEDI BOLLETTINI PRECEDENTI)

MELO/PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

PER LE AZIENDE CHE AD OGGI NON HANNO AVUTO INFEZIONI, IN GENERALE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI DI COPERTURA CON TURNI DI INTERVENTO PIÙ ALLUNGATI RISPETTO A QUANTO CONSIGLIATO FINO AD OGGI.

PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (750 g./HA) (DELAN 70WG) .)(COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 1 2 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG

OPPURE

DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

ZOLFO (THIOPRON) (ATTIVO ANCHE CONTRO OIDIO)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO L'INIZIO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE (II° GEN): SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE* (INTREPID) (MASSIMO 3 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE* (MIMIC)


(* AL MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TIACLOPRID (CALYPSO) (MASSIMO 2 INTERVENTI, 1 SOLO NEL CASO SI SIANO GIÀ IMPIAGATI NEONICOTINOIDI): EFFICACE ANCHE CONTRO AFIDI E TORTRICIDI RICAMATORI



SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI-MATURAZIONE)

CYDIA FUNEBRANA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

