



## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 10**  
06/07/2016

### **PESCO** (INGROSSAMENTO FRUTTI-MATURAZIONE)

#### **CYDIA MOLESTA**

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI  
ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE  
LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

- **CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC., T.C. 15 GG.)  
(COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,5 LT/HA DI  
FORMULATO ALL'ANNO)**
- **EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM, T.C.. 7 GG.) (2  
INT./ANNO)**
- **INDOXACARB (STEWARD, T.C. 7 GG) (MASSIMO 2 INT./ANNO)**
- **FOSMET (SPADA, T.C. 14 GG) (2 INT./ANNO)**
- **ETOFENPROX (TREBON, T.C. 7 GG)**
- **BACILLUS THURINGENSIS (VARI, T.C. 3 GG)**

#### **MONILIA**

VISTA LA DELICATA FASE FENOLOGICA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN  
PRE-RACCOLTA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- **FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)**
- **TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)**
- **CIPROCONAZOLO (GALEO, T.C. 3 GG) (MASSIMO 2INT/ANNO)  
(CON IBE MASSIMO 4 INT/ANNO SU PESCO)**
- **FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2  
INTERVENTI/ANNO)**
- **BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2  
INTERVENTI/ANNO)**
- **BOSCALID + PYRACLOSTROBIN (BELLIS DRUPACEE)  
T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**
- **TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT  
MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

PER LE AZIENDE CHE AD OGGI NON HANNO AVUTO INFEZIONI, IN GENERALE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI DI COPERTURA CON TURNI DI INTERVENTO PIÙ ALLUNGATI RISPETTO A QUANTO CONSIGLIATO FINO AD OGGI.

PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

- DITHIANON (750 g./HA) (DELAN 70WG) )(COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)
- FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG
- DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

## MELO-PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

SULLA BASE DEI DATI DI MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI SIAMO IN FASE LARVALE DELLA II GENERAZIONE: PER CHI NON FOSSE INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

- CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)
- EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)
- FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)
- SPINOSAD (LASER)

## PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### PSILLA

- IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LAVAGGI IN PRESENZA DI MELATA, OPPURE L'IMPIEGO DI PRODOTTI A BASE DI:
- OLIO ESTIVO (VARI)



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### AFIDE LANIGERO

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LAVAGGI OPPURE INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI

- IMIDACLOPRID\* (CONFIDOR)
- ACETAMIPRID\* (EPIK)
- THIAMETOXAM\* (ACTARA)
- SPIROTETRAMAT (MOVENTO)

(\*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO PER L'AVVERSITÀ)

## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI-MATURAZIONE)

---

### CYDIA FUNEBRANA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

- EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.
- FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.
- ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.
- THIACTOPRID (CALIPSO)
- SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

