

COORDINAMENTO TECNICO
VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 12
01/09/2016

PESCO
(MATURAZIONE/RACCOLTA)

CYDIA MOLESTA

SU VARIETÀ TARDIVE ED IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

- **EMAMECTINA BENZOATO** (AFFIRM, T.C.. 7 GG.) (2 INT./ANNO)
- **INDOXACARB** (STEWART, T.C. 7 GG) (MASSIMO 2 INT./ANNO)
- **ETOFENPROX** (TREBON, T.C. 7 GG)
- **SPINOSAD** (LASER, T.C. 7 GG)
- **BACILLUS THURINGENSIS** (VARI, T.C. 3 GG)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN PRE-RACCOLTA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- **FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)
- **TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
- **CIPROCONAZOLO** (GALEO, T.C. 3 GG) (MASSIMO 2INT/ANNO) (CON IBE MASSIMO 4 INT/ANNO SU PESCO)
- **FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- **BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- **BOSCALID + PYRACLOSTROBIN** (BELLIS DRUPACEE) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- **TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA CHE, SOLO PER I PESCHETI COLPITI DA GRANDINATE, È STATA CONCESSA LA DEROGA REGIONALE PER L'IMPIEGO DI PRODOTTI A BASE DI **CAPTANO**, IN POST-RACCOLTA CONTRO **MONILIA E CANCRI RAMEALI**.

MELO-PERO (MATURAZIONE)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

- CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)
(COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)
- EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)
- ETOFENPROX (TREBON T.C. 7GG: AL MASSIMO 1 TRATTAMENTO ALL'ANNO ENTRO 2 SETTIMANE DALLA RACCOLTA)
- FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)
- SPINOSAD (LASER)

(TALI PRODOTTI HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO CYDIA DEL PESCO)

MELO (MATURAZIONE/RACCOLTA)

MARCIUMI DA CONSERVAZIONE

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA E SENSIBILI ALLO SVILUPPO DI MARCIUMI IN FASE DI CONSERVAZIONE, IN CASO DI UTILIZZO DI PRODOTTI A BASE DI **CAPTANO**) (TRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 12 TRATT./ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ) SI RICORDA DI FARE ATTENZIONE AL TEMPO DI CARENZA: **T.C.21G.G.**

MELO (MATURAZIONE)

BUTTERATURA AMARA

NEI MELETI SOGGETTI A TALE FISIOPATIA, SI CONSIGLIA DI RIPRENDERE I TRATTAMENTI CON CALCIO PER VIA FOGLIARE.



SUSINO (MATURAZIONE/RACCOLTA)

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

- EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.
- ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.
- SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

