




30 marzo 2016  
INFO FLASH NOCCIOLO  
n° 03

**Agrion**  
Agricoltura ricerca innovazione

 Confagricoltura  
Cuneo



**ASCOPIEMONTE** s.c.  
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI FRUTTA A GUSCIO

 Piemonte Asprocor

Coordinamento Tecnici di base

## AGGIORNAMENTO TECNICO

### **FASI FENOLOGICHE LOCALI**

### **SITUAZIONE ERIOFIDE: QUANDO E COME INTERVENIRE**



---

Mauro Forneris 335-215309  
Claudio Sonnati 334-6986914

Corilicoltura

Agrion – Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese



## FASI FENOLOGICHE LOCALI.

I controlli effettuati dai tecnici del Coordinamento Corilicolo evidenziano la situazione riassunta in tabella:

ZONA	FASE FENOLOGICA PREVALENTE
ALESSANDRINO	Terza foglia
ALBESE (pianura)	Terza foglia distesa
ALBESE (collina)	Terza foglia
ASTIGIANO (Nord)	Terza foglia
ASTIGIANO (Bassa Bormida)	Terza foglia
CARRUCCESE (pianura)	Terza foglia distesa
PIANURA CUNESE	Terza foglia distesa
MONREGALESE (collina)	Terza foglia distesa

Nelle zone di **Carrù (pianura) e Pianura Cuneese E' INIZIATA LA MIGRAZIONE. In queste zone si CONSIGLIA DI INTERVENIRE.**

**Nelle restanti aree la migrazione NON E' ANCORA INIZIATA. Attendere prossimi bollettini.**

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g- mL/hL	DOSE kg- L/ha	CAREN ZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
TERZA FOGLIA (D)	ERIOFIDE GALLIGENO	ZOLFO (1)	VARI	250 - 500	2,5 - 5,0 (1)	5	(1) Comprende tutte le formulazioni: SC - WG - WP. In presenza di forte infestazione eseguire almeno 3-4 interventi distanziando le applicazioni al massimo di 10 giorni. Si consiglia l'aggiunta di un apposito adesivante. Consigliati dosaggi d'acqua di 930 litri ettaro.
	OIDIO	ZOLFO IN POLVERE	MINERALE DI ZOLFO 33 ecc	--	70 - 100	5	Le avverse condizioni metereologiche, riscontrate nell'ultimo biennio, hanno evidenziato la recrudescenza di questo fungo in epoca precoce. Pertanto si consiglia di eseguire trattamenti di contenimento adottando le tempistiche indicate per l'Eriofide galligeno.

NOTA GENERALE: Le sperimentazioni sulla distribuzione degli agrofarmaci in corileto, hanno definito che il volume da utilizzare nella distribuzione sia prossimo ai 930 L/ha. Aggiungere adeguate quantità di bagnanti alle distribuzioni di formulati liquidi.

Mauro Forneris 335-215309  
 Claudio Sonnati 334-6986914

Corilicoltura

Agriion – Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese