



22 marzo 2016
INFO FLASH NOCCIOLO
n° 02

Coordinamento Tecnici di base

Agrion
Agricoltura ricerca innovazione

 Confagricoltura
Cuneo



 **ASCOPIEMONTE** s.c.
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI FRUTTA A GUSCIO

 Piemonte Asprocor

AGGIORNAMENTO TECNICO

FASI FENOLOGICHE LOCALI

**COCCINIGLIA E ERIOFIDE:
QUANDO E COME
INTERVENIRE**

RAME APPENA POSSIBILE





FASI FENOLOGICHE LOCALI.

I controlli effettuati dai tecnici del Coordinamento Corilicolo evidenziano la situazione riassunta in tabella:

ZONA	FASE FENOLOGICA PREVALENTE
ALESSANDRINO	Rottura gemme, abbozzo prima foglia
ALBESE (pianura)	Rottura gemme, abbozzo prima foglia
ALBESE (collina)	Prima foglia in distensione
ASTIGIANO (Nord)	Rottura gemme, abbozzo prima foglia
ASTIGIANO (Bassa Bormida)	Rottura gemme, abbozzo prima foglia
CARRUCCESE (pianura)	Rottura gemme, abbozzo prima foglia
PIANURA CUNEESE	Rottura gemme, abbozzo prima foglia
MONREGALESE (collina)	Prima foglia in distensione

Al momento risulta che le forme mobili dell'acaro sono presenti solo all'interno delle gemme e quindi la **MIGRAZIONE NON E' ANCORA INIZIATA.**

COCCINIGLIA ED ERIOFIDE: QUANDO E COME INTERVENIRE.

In molti nocciuleti, in particolare in pianura, risulta difficile poter entrare con gli atomizzatori. Dove è necessario trattare contemporaneamente Cocciniglia ed Eriofide, si consiglia la distribuzione del prodotto Polithiol. Ricordiamo che è necessario utilizzare un quantitativo di 50 litri di prodotto commerciale per ettaro di superficie trattata, indipendentemente dal quantitativo di acqua utilizzata nella diluizione, pena la mancata azione di contenimento. Questa soluzione, che viene dilavata da precipitazioni temporalesche battenti pari o superiori a 40 mm, non causa ustioni particolari alla vegetazione del nocciolo anche in presenza di un abbassamento termico compreso fra -1°C / $-1,5^{\circ}\text{C}$. La soluzione è efficace solo ed esclusivamente se viene a contatto con gli insetti che intendiamo contenere; è quindi necessario eseguire una distribuzione **ACCURATA** ed **OMOGENEA** senza lesinare



22 marzo 2016

INFO FLASH NOCCIOLO

n° 02

oltremisura sui quantitativi (1.000 litri di soluzione) consigliati ad ettaro. Trascorsi 15 giorni dall'intervento sarà necessario eseguire un controllo sullo stadio di migrazione dell'Eriofide.

RAME APPENA POSSIBILE.

Per contrastare le infestazioni delle malattie che colpiscono la vegetazione ed il legno delle nocciole (batteriosi, cancri rameali e Citospora), eseguire un intervento, appena sarà possibile accedere nei nocciolieti in particolare in quelli di pianura e fondovalle, con uno dei seguenti p.a.:

- un prodotto a base di RAME al dosaggio minimo riportato sulle etichette dei diversi formulati. Si ricorda che i prodotti a base di rame idrossido hanno un'azione pronta ma meno persistente rispetto a quelli a base di poltiglie bordolesi oppure gli ossicloruri. Si ricorda che l'impiego del p.a. RAME deve essere contenuto a 6 kg di sostanza attiva all'anno;
- il primo intervento con il p.a. Acibenzolar S methyl (50 ml/ettaro – ammessi 4 interventi all'anno).