

Info n. 20

Del 24/07/2018



Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO

Fase fenologica

Cimici del nocciolo: catture contenute

Prodotti “alternativi”: efficacia da verificare

Fase fenologica

Prosegue l'accrescimento del seme all'interno della noccola. Ormai in quasi tutte



le località di produzione piemontese le infruttescenze di nocciolo si trovano tra le fenofasi "Accrescimento mandorla" (H – fase 2) e "Definizione Mandorla" (I) come risulta dalle fotografie

allegate da cui si evince che continuano a risultare presenti sulle piante ancora infiorescenze vuote o abortite.



Cimici del nocciolo: catture contenute

Trappole

In generale si nota una **riduzione degli individui catturati** con presenza di neanidi in leggero aumento nella maggioranza delle realtà corilicole.

Solo nelle zone di Vercelli, Novara (in prossimità del Lago di Viverone) e in alcune località del torinese si segnalano catture mediamente elevate.

Frappage

Nei **frappage** eseguiti in settimana in alcune zone (Albese e Alessandrino) si è notato l'**incremento** della presenza di **cimici nostrane** e di quelle che attaccano i cereali.

Per le zone **dove sono state riscontrate elevate catture**, si è consigliato il secondo intervento insetticida, mentre per le altre zone si aspettano i risultati dei **frappage** che verranno eseguiti in settimana.

Per quanto riguarda lo svernamento in seguito all'elevata mortalità degli adulti di cimice asiatica all'interno delle scatole (in alcuni casi il 100%) sono state avviate le procedure di raccolta degli insetti che verranno consegnati ai centri di ricerca per tentare di stabilire le cause della mortalità.

Avvicinandosi la fase preparatoria alla raccolta, ma restando elevato il rischio di danno da cimice sulle nucule in accrescimento, si consiglia di proseguire con controlli visivi per un attento e periodico monitoraggio della situazione in tutte le zone. I corilicoltori sono invitati a segnalare **TEMPESTIVAMENTE** ai tecnici di zona l'eventuale incremento delle presenze di cimici nei corileti.

Prodotti "alternativi": efficacia da verificare

Sul mercato vengono proposti prodotti "alternativi" (repellenti, concimi, additivi etc) i quali, a detta delle società distributrici, dovrebbero svolgere un'azione di controllo sulla Cimice asiatica.

Allo stato attuale, Agrion ha effettuato prove di efficacia esclusivamente sui prodotti registrati come agrofarmaci (vedi tabella allegata) mentre su questo genere di prodotti, per i quali richiede un tipo di valutazione più complesso, si prevede l'attuazione di prove di efficacia nel corso di questa stagione.

In conclusione, A TUTT'OGGI NON SONO DISPONIBILI PROVE TECNICHE CHE ABBIANO DIMOSTRATO L'EFFICACIA DI QUESTI PRODOTTI.