Agrion
Agricoltura ricerca innovazione

Info nocciolo n. 20
Del 29/07/2020

NOCCIÒLO



Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO

AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE

CAMPIONAMENTO CIMICI: LA SITUAZIONE AGGIORNATA

***Cytospora corylicola*: INTERVENTI CONSIGLIATI DOPO LA RACCOLTA**

Dopo il temporale che a fine giornata di mercoledì 22 luglio si è abbattuto sul cuneese con violente raffiche di vento e grandine che hanno causato danni in molti comuni della provincia, la situazione meteo è tornata stabile con un lieve indebolimento dell'alta pressione a partire da inizio di questa settimana. In seguito si ripristinerà tempo stabile con maggior apporto di aria calda (temperature diurne superiori ai 30°C) di origine afro-mediterranea che acuirà l'afa.

Una nuova situazione instabile si presenterà a sud dell'arco alpino tra la notte di mercoledì e giovedì.

In tabella 1 i dati meteo di alcune stazioni nell'areale corilicolo per la settimana dal 22 al 28 luglio. Per le stazioni di Cravanzana e Pinerolo, dotate di sistema di rilevazione della velocità del vento, sono stati indicati anche i valori max di velocità del vento registrati il 22 luglio scorso .

STAZIONE	PROVINCIA	T MAX °C	T MIN °C	T MEDIA °C	PIOGGIA TOT (mm)	Velocita Max Vento a 2 m (m/s)	Velocità Max vento a 2m (Km/h)
Cravanzana	**CN**	28,8	15,0	21,4	3,8	4,7	16,9
Gabiano	**AL**	32,7	18,8	25,2	1,8	--	--
Moncalvo	**AT**	32,1	17,3	24,3	5,2	--	--
Pinerolo	**TO**	32,3	16,9	24,7	1,2	5,1	18,4
Viverone	**BI**	32,3	18,2	24,7	49,8	--	--

Tab. 1 – Temperature °C (Max, Min, e Medie), Pioggia e velocità max vento di alcune stazioni in areali corilicoli

(Fonte: Servizio Agrometereologico- Regione Piemonte)

AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE

Si segnala che nelle zone più anticipate parte dei frutti è già cascolato a terra come evidenziato dalle immagini (Foto A. Marino).

Costigliole d'Asti (AT) - 28/07/2020

Santo Stefano Roero (CN) - 28/07/2020

Mombaldone (AT) - 28/07/2020

Govone (CN) - 28/07/2020

CAMPIONAMENTO CIMICI: LA SITUAZIONE AGGIORNATA

Le catture in trappola (principalmente neanidi) si mantengono in tutte le zone con valori contenuti.

Poche catture anche negli ultimi *frappage* eseguiti ad inizio settimana, anche se per alcune zone,c'è stato un incremento rispetto alla settimana precedente e questo ha richiesto un intervento insetticida per il contenimento.

Poiché le operazioni di raccolta sono anticipate in tutte le zone (per alcune come alessandrino e torinese si ipotizza di iniziare a partire dalla prossima settimana) si raccomanda alle aziende, nel caso registrassero presenza di cimici (adulti e neanidi) in campo, di contattare il tecnico di riferimento per valutare insieme la strategia da applicare in questa fase.

CITOSPORA: INTERVENTI CONSIGLIATI IN POST RACCOLTA

Si segnala anche la recrudescenza degli attacchi di *Cytospora corylicola* il cui controllo dovrà essere programmato in post raccolta con adeguate potature ed eliminazione del legno infetto.

Fig. 1

Fig.2