

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086
ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Bollettino di difesa della vite n°7 del 14/06/2018

PERONOSPORA

Vista la fase di fine fioritura/inizio allegagione e date le condizioni meteo non ancora stabilizzate si consiglia di mantenere la copertura utilizzando prodotti a base di:

Rame (6 Kg/anno di s.a., anche per le aziende Biologiche) ecc...**

*tra questi principi attivi al max 4 trattamenti/anno indipendentemente dall'avversità, di cui al max 3 di Mancozeb
Nei vigneti dove si sono presentati sintomi su foglia o su grappolo è consigliabile abbinare dei prodotti a sistemica locale, attenendosi sempre ai limiti di etichetta e dei disciplinari (PSR).

E' possibile utilizzare:

**Dimetomorf o Iprovalicarb o Mandipropamid (Max 3 tratt/Anno x gruppo)
o Cimoxanil (Max 3 tratt/Anno) o Oxathiapiprolin (Max 2 tratt/Anno) ecc...**

OIDIO

Si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico anche: **Zolfo bagnabile (anche per le aziende Biologiche)**. Attenendosi sempre ai limiti di etichetta e dei disciplinari (PSR), è bene abbinare prodotti sistemici, per contrastare i rischi infezione, quali:

Penconazolo, Tebuconazolo, ecc... (Max 3 tratt/Anno x gruppo)

Ciflufenamid (max 2 tratt/Anno), Boscalid (max 1 Tratt/Anno con ha effetto collaterale contro la Muffa grigia/Botrite)

Successivamente al trattamento sopraindicato si consiglia di effettuare un trattamento con Zolfo in polvere a dosi di etichetta.

BOTRITE/Muffa Grigia

A seguito del manifestarsi di sintomi su foglia è consigliabile effettuare, nelle aree soggette e nei vigneti sensibili, un trattamento in fase di fine mignolatura (fine allegagione/inizio chiusura grappolo). Utilizzare principi attivi come:

Fenexamide (max 1 tratt/Anno), Boscalid (max 1 Tratt/Anno), Fluazinam ecc...

E' importante che prima di trattare con l'antibotritico venga effettuata la pulizia della fascia grappoli mediante defogliazione/potatura verde e sfalcio dell'interfila. Effettuare trattamenti su tutti i filari.

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, maggiormente riguardanti delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI CULTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546 - Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / 322272 - Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI