

ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite
N° 06 del 16/06/2016

PERONOSPORA

Le piogge continue, i temporali con la presenza di grandine, le bagnature fogliari ed il periodo ancora molto instabile rendono la vegetazione a rischio di infezioni.

Si consiglia di intervenire con prodotti a base di

Folpet, Rame

Mancozeb (dove non terminata la fioritura)

Si ricorda per le aziende che utilizzano prodotti sistemici (Metalaxil M, Benalaxil M, Fluopicolide, Fosetil Alluminio, Cyazofamid, Zoxamide, ecc...) che il trattamento deve essere effettuato alla scadenza del singolo principi attivo.

OIDIO

La fase di post-fioritura rende la pianta, in particolare i grappoli più suscettibili ad attacchi del patogeno, quindi si consiglia, con l'intervento antiperonosporico, di mantenere la copertura della vegetazione con

Zolfo bagnabile

Per coloro che utilizzano prodotti a lunga persistenza trattare a scadenza della sostanza attiva usata in precedenza (I.B.E., Cyflufenamid, Quinoxifen, Bupirimate, Metrafenone, ecc...)

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni in etichetta, e per l'agro ambiente, alle limitazioni citate nel disciplinare delle norme tecniche che riguardano le singole sostanze attive e l'insieme delle stesse, specialmente rispettare la soglia massima di 6 Kg/Ha di RAME METALLO all'anno.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243