

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA
COMITATO DI CORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV Novembre, 44 – 15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131/52086

ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite
N° 04 del 22/05/2015

PERONOSPORA

Viste le piogge del 20 e 21 maggio, le successive bagnature, le previsioni di tempo variabile e la fase fenologica di inizio fioritura, per le aziende che intendono utilizzare prodotti di media – lunga durata atti a proteggere la vegetazione in accrescimento, intervenire appena possibile con prodotti a base di

FOSETIL ALLUMINIO

METALAXIL**

BENALAXIL**

DIMETOMORF***

IPROVALICARB***

MANDIPROPAMIDE***

ZOXAMIDE****

**LE AZIENDE CHE INTENDONO UTILIZZARE PRODOTTI
DI CONTATTO ATTENDANO IL SEGNALE ACUSTICO.**

OIDIO

La fase fenologica di inizio fioritura rende la vite molto sensibile al patogeno. Per le aziende che intendono intervenire con prodotti endoterapici si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico un prodotto a base di

CYFLUFENAMID*

SPIROXAMINA**

I.B.E**

***al massimo 2 interventi/anno per le aziende che adottano sistemi di lotta integrata.**

****al massimo 3 interventi/anno per le aziende che adottano sistemi di lotta integrata.**

*****al massimo 4 trattamenti/anno per le aziende che adottano sistemi di lotta integrata. Dopo il terzo trattamento consecutivo impiegare s.a. antiperonosporiche a diverso meccanismo d'azione.**

******al massimo 4 trattamenti/anno per le aziende che adottano sistemi di lotta integrata.**

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.