

# PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/07  
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA  
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086  
ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa della vite n° 12 del 23/07/2015

**FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE - TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI**  
**secondo trattamento: DAL 23 LUGLIO AL 28 LUGLIO**

## **STRATEGIA CONSIGLIATA**

(per le aziende che come primo trattamento avessero utilizzato un P.A. a base di: clorpirifos etile o tiamethoxam + clorantraniliprole)

**Tiamethoxam** (21 giorni di carenza)

## **in alternativa**

**sono ammessi al trattamento contro lo Scaphoideus T. :**

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Etofenprox	Fenossibenil eteri	14
Clorpirifos etile	Fosfororganici	30
Clorpirifos metile	Fosfororganici	15
Acetamiprid	Neonicotinoidi	14

**utilizzare una sostanza attiva diversa da quella impiegata nel primo trattamento**

**PER QUALSIASI PRODOTTO UTILIZZATO, PRESTARE MOLTA ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA E TRATTARE NELLE ORE PIU' FRESCHE DELLA GIORNATA**

DOPO IL TRATTAMENTO E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) **ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI** PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).

## **Salvaguardia degli insetti pronubi**

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

## **ACCORGIMENTI**

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.