

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Fase fenologica: Inizio fioritura BBCH 61

Bollettino di difesa della vite n°5 del 29/05/2020

PERONOSPORA

Molte zone sono interessate da un accelerato e difforme inizio di fioritura, dovuto all'innalzamento delle temperature minime. Viste la fase fenologica delicata e le ripetute bagnature fogliari, è necessario effettuare un trattamento di copertura, utilizzando prodotti a base;

Rame Metallo o **Mancozeb** (max 3 volte entro il 30/06) o **Metiram** (max 3 volte entro il 30/06) o **Ditianon** (max 3 volte entro il 30/06) o **Folpet** (max 3 volte)

Per chi avesse utilizzato nel precedente intervento prodotti a diverso meccanismo di azione, si consiglia di mantenere la copertura a scadenza, utilizzando prodotti ad azione sistemica come: **Metalaxil-M o Benalaxil / Benalaxil-M** (Max 3 volte Tot) o **Dimetomorf o Iprovalicarb o Mandipropamid** (Max 3 tratt/Anno x gruppo) o **Oxathiapiprolin** (Max 2 volte) ecc...

ATTENZIONE: limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).

Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

OIDIO

Aggiungere alla miscela **Zolfo bagnabile** colloidale alle dosi di etichetta o altro prodotto antioidico di copertura.

IMPORTANTE: EFFETTUARE I TRATTAMENTI IN ASSENZA DI VENTO PER EVITARE INQUINAMENTO PUNTIFORME, PERDITE DI PRODOTTO E DELLA SUA EFFICACIA

Comunicare al servizio tecnico se si notano sintomi di qualsiasi natura, su foglia o su grappolo.

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardanti delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI