DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Bollettino di difesa della vite n°5 del 31/05/2017

OIDIO

In fase di fioritura, ed in assenza di copertura il rischio di infezioni aumenta, tenendo conto delle singole realtà aziendali e varietali, si consiglia di intervenire **nella fase di fine fioritura** con

ZOLFO IN POLVERE a 25-30 Kg/Ha.

Nelle realtà dove la malattia è particolarmente temibile è opportuno usare prodotti sistemici di maggiore persistenza:

IBE, Metrafenone o Bupirimate

integrando il trattamento liquido con **ZOLFO BAGNABILE**

PERONOSPORA

In questo periodo con un clima asciutto e stabile, i rischi di Peronospora non sono elevati, tuttavia nei fondovalle, dove si sono manifestate bagnature fogliari o nei vigneti che nel periodo passato hanno manifestato la presenza della malattia, anche sporadicamente su grappolo, si consiglia di aggiungere al trattamento liquido antioidico:
MANCOZEB, RAME associati a **DIMETOMORF, CIMOXANIL, MANDIPROPAMMIDE, FOSETIL D'ALLUMINIO, IPROVALICAB, FLUOPICOLIDE**...ecc

SI RICORDA DI NON EFFETTUARE TRATTAMENTI IN PIENA FIORITURA

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni in etichetta, e per l'agro ambiente, alle limitazioni citate nel disciplinare delle norme tecniche che riguardano le singole sostanze attive e l'insieme delle stesse, specialmente rispettare la soglia massima di 6 Kg/Ha di RAME METALLO all'anno.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. ~~0144 / 356582~~
Coldiretti : Tel. 0144 / 322546
Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272
Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243
Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri