DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013 COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 3 del 02.05.2017

Fase fenologica prevalente: Grappoli visibili

PERONOSPORA

Trattare

La vite ha ormai raggiunto, un po' in tutte le situazioni e le esposizioni, uno sviluppo tale da renderla sensibile agli attacchi di questo patogeno.

Nel contempo le attuali condizioni climatiche e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni disegnano una situazione di grande instabilità.

In questa situazione, anche se è, ad ora, improbabile la comparsa di sintomi della malattia, si consiglia di prevenire eventuali infezioni intervenendo, QUANDO LE CONDIZIONI CLIMATICHE LO CONSENTONO, con prodotti a base di:

 $Prodotti\ citotropici\ ({\tt Dimetomorf}, {\tt Mandipropamid}, {\tt Iprovalicarb}, {\tt Cymoxanil}) \\$

+

Prodotto di copertura (Folpet, Mancozeb, Metiram, Propineb).

Nei vigneti che sono stati colpiti nei giorni scorsi dalla gelata o nelle porzioni di essi in cui non vi è presenza di vegetazione efficiente, attendere l'emissione e lo sviluppo dei nuovi germogli, per effettuare l'intervento.

OIDIO

Trattare

La costanza con la quale i venti soffiano in questo periodo e la sensibilità della vite al "Mal Bianco", inducono a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Meptyl-dinocap**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800 Confagricoltura Alessandria 0142 452209 Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617