

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 9 del 06.08.2019

Fase fenologica prevalente: **Inizio invaiatura grappoli**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le previsioni di nuove perturbazioni, fanno ritenere opportuno il mantenimento della copertura antiperonosporica intervenendo entro fine settimana, con prodotti a base di **Rame**.

Si ricorda che da questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Questo particolare momento fenologico rende fortemente consigliabile un trattamento antioidico a base di **Zolfo bagnabile**. Si raccomanda di non esagerare con le dosi per evitare, con le attuali temperature, ustioni ai grappoli.

MUFFA GRIGIA

Lotta indiretta: si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde. In caso di particolare pericolo, volendo attuare una lotta diretta al fungo, si consiglia di contattare il servizio tecnico.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617