# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° **9** del **06.08.2018**

Fase fenologica prevalente: **Inizio invaiatura**

## PERONOSPORA

**Trattare**

Si consiglia di mantenere la viti protette contro questa malattia impiegando prodotti a base di **Rame**.

È opportuno ricordare la restrizione a 6 chilogrammi di sostanza attiva ad ettaro e per annata agraria. In caso di difficoltà a rispettare le norme previste dal disciplinare, si consiglia di contattare il tecnico per definire strategie alternative.

## OIDIO

**Non trattare**

Nei vigneti in cui le uve hanno ormai raggiunto la fase di invaiatura, la lotta all'oidio può considerarsi conclusa. Nei restanti casi si consiglia di unire al trattamento antiperonosporico un antioidico a base di Zolfo Bagnabile.

## MUFFA GRIGIA

**Valutare**

**LOTTA INDIRETTA:** Si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde.

**LOTTA DIRETTA:** per le varietà sensibili che abbiano già raggiunto la fase fenologica di prechiusura del grappolo, si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di **Fludioxonil + Ciprodinil**, opp. **Fenexamide**, opp. **Fenpyrazamine,** opp. **Boscalid**.

Si consiglia di intervenire solo sulla fascia del grappolo

Si ricorda che non è possibile ripetere lo stesso principio attivo già eventualmente utilizzato.

**Attenzione ai tempi di carenza.**

**VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI**

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617