

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 10 del 06.08.2019

Fase fenologica prevalente: **Inizio invaiatura grappolo**

## PERONOSPORA

**Trattare**

Le previsioni di nuove perturbazioni, fanno ritenere opportuno il mantenimento della copertura antiperonosporica intervenendo entro fine settimana, con prodotti a base di **Rame**.

Si rammenta il vincolo dei 4 kg al massimo di sostanza attiva Rame utilizzabile all'anno e all'ettaro.

## OIDIO

**Trattare**

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica e l'eccezionale incidenza della malattia nel corso dell'attuale campagna, inducono la massima attenzione nella prevenzione. Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Metrafenone**. Si ricorda che il Metrafenone può essere impiegato per un massimo di 3 trattamenti.

## MUFFA GRIGIA

**Trattare**

**Lotta indiretta:** si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde.

**Lotta diretta:** per le varietà sensibili che abbiano già raggiunto la fase fenologica di inizio invaiatura del grappolo, si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di **Fludioxonil + Ciprodinil**, opp. **Fenexamide**, opp. **Fenpyrazamine**.

Si consiglia di intervenire solo sulla fascia del grappolo

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800  
Confagricoltura Alessandria 0142 452209  
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617