

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 7 del **09.07.2018**

Fase fenologica prevalente: **Pre-chiusura grappolo**

## PERONOSPORA

**Trattare**

Le piogge abbondanti e violente della scorsa settimana e le conseguenti prolungate bagnature fogliari, fanno ritenere indispensabile il mantenimento della copertura intervenendo entro mercoledì 11 luglio, con prodotti a base di:

**Cyazofamid + Fosfonato di Sodio**

oppure

**Dimetomorf o Mandipropamid + Rame**

## OIDIO

**Trattare**

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, induce a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Metrafenone**.

Si ricorda che il Metrafenone può essere impiegato per un massimo di 3 trattamenti.

## MUFFA GRIGIA

**Trattare**

**Lotta indiretta:** si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde.

**Lotta diretta:** per le varietà sensibili che abbiano già raggiunto la fase fenologica di prechiusura del grappolo, si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di **Fludioxonil + Ciprodinil**, opp. **Fenexamide**, opp. **Fenpyrazamine**, opp. **Boscalid**.

Si consiglia di intervenire solo sulla fascia del grappolo

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800  
Confagricoltura Alessandria 0142 452209  
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617