

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 10 del 19.08.2019

Fase fenologica prevalente: **Inizio invaiatura grappoli**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Si consiglia di mantenere le viti protette contro questa malattia impiegando prodotti a base di **Rame** indirizzando i getti prioritariamente verso la parte alta delle chiome al fine di proteggere la vegetazione nuova e più delicata.

È opportuno ricordare la restrizione che, da quest'anno, condiziona l'utilizzo del rame limitandone l'impiego a 4 chilogrammi di sostanza attiva ad ettaro e per annata agraria. In caso di difficoltà a rispettare le norme previste dal disciplinare, si consiglia di contattare il tecnico per definire strategie alternative.

OIDIO

Valutare

La malattia non è in grado di insediarsi su uve ormai invaiate e la lotta all'oidio può in questo caso considerarsi conclusa. Ove invece la malattia fosse presente e diffusa e non si volesse permettere al fungo di invadere i tessuti verdi delle viti, si consiglia di unire al trattamento antiperonosporico un antioidico a base di Zolfo Bagnabile.

MUFFA GRIGIA

Sfogliare

Lotta indiretta: si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde. In caso di particolare pericolo, volendo attuare una lotta diretta al fungo, si consiglia di contattare il servizio tecnico.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617