

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 2 del 23.04.2020

Fase fenologica prevalente: **Germogliamento**

PERONOSPORA

Trattare

La pioggia caduta nel periodo appena trascorso e le temperature medie ormai assestatesi ben al di sopra dei 10°C, indicano l'opportunità di un intervento in tutti i vigneti nei quali la vegetazione ha raggiunto un sufficiente sviluppo (10 - 15 cm). Si consiglia quindi di effettuare un primo trattamento antiperonosporico a base di

Dimetomorf oppure **Mandipropamid + Mancozeb**

Si consiglia di intervenire entro il fine settimana.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo Bagnabile**. È possibile, in alternativa, far seguire al trattamento antiperonosporico un intervento a base di **Zolfo in Polvere**.

Dove la vegetazione non ha ancora raggiunto lo sviluppo dei 5-10 cm., oppure man mano che questa lunghezza viene raggiunta, occorrerà intervenire localmente con **Zolfo in Polvere**.

NOTTUE

Monitorare

Si sono segnalati attacchi di Nottua contraddistinti dall'asportazione più o meno accentuata dei giovani germogli. Ove la vegetazione sia ancora poco sviluppata e si osservino le tipiche erosioni, si consiglia di contattare con urgenza il proprio tecnico per valutare la necessità di un intervento specifico.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617