

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 3 del 28.05.2018

Fase fenologica prevalente: **Bottoni fiorali separati**

PERONOSPORA

Trattare

Permanendo condizioni di forte instabilità climatica e continue probabili infezioni primarie, non ancora giunte a manifestare il sintomo, è opportuno bloccare l'inizio delle nuove infezioni e mantenere protetta la vegetazione.

In tali condizioni si consiglia, di intervenire con prodotti a base di:

Prodotti sistemici (Benalaxil M, Metalaxil M)

+

Prodotto di copertura (Folpet*, Mancozeb*, Metiram, Propineb).

(* Folpet e Mancozeb possono essere utilizzati ciascuno per un massimo di 3 interventi)

OIDIO

Trattare

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, induce a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto **antioidico sistemico (I.B.E.)**.

Si ricorda che alcuni principi attivi possono essere impiegati un'unica volta. Quindi, se qualcuno di essi (Ciproconazolo, Difenconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo, Tebuconazolo e Futriafol) è già stato impiegato, occorrerà utilizzare una molecola differente sempre appartenente al gruppo dei Triazoli.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617