#### DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013 COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 1 del 02.05.2018

Fase fenologica prevalente: Grappoli visibili

# **BIOLOGICO**

### **PERONOSPORA**

**Trattare** 

Esistono le condizioni per la partenza delle infezioni peronosporiche delle vite.

Nel contempo persistono condizioni instabilità.

## NON APPENA LA TRANSITABILITA' DEI TERRENI LO CONSENTE, con prodotti a base di RAME

Si rammenta il limite dei 6 Kg di rame metallo impiegabile per anno e per ettaro. A tal proposito si raccomanda di utilizzare prodotti a bassa concentrazione e basso dosaggio di Rame.

#### **OIDIO**

**Trattare** 

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, inducono a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI