

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 4 del 05.06.2018

Fase fenologica prevalente: **Pre-fioritura**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le continue piogge e la sensibilità della vite in questo periodo non consentono interruzioni nella protezione da questa malattia. Nella attuale fase fenologica, in cui eventuali infezioni potrebbero manifestarsi nella forma larvata al completamento della fase erbacea dell'accrescimento degli acini, è indispensabile, per non perdere parte della produzione, mantenere una costante copertura con prodotti a base di **Rame**.

TRATTARE NON APPENA LA TRANSITABILITA' DEI TERRENI LO CONSENTA

Si rammenta il limite dei 6 Kg di rame metallo impiegabile per anno e per ettaro. A tal proposito si raccomanda di utilizzare prodotti a bassa concentrazione e basso dosaggio di Rame.

OIDIO

Trattare

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, inducono a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617