

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 6 del 05.06.2020

Fase fenologica prevalente: **Fine fioritura - Allegagione**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le continue piogge dell'ultimo periodo e un clima che stenta ad acquisire la connotazione estiva, inducono a considerare elevato il pericolo di infezione. Contestualmente risulta elevata la possibilità di assistere, ad avvenuto completamento del grappolo, a manifestazioni di peronospora nella sua forma larvata. È quindi indispensabile intervenire entro la fine di questa settimana e comunque non appena le condizioni di transitabilità lo consentono, con prodotti a base di **Rame**.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

In questa fase di rapido sviluppo, la vegetazione risulta estremamente sensibile all'attacco dei funghi e nello specifico del Mal Bianco. Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di Zolfo bagnabile.

Nel caso si fossero intraprese strategie alternative, come specificato nel precedente bollettino, è opportuno proseguirle nel rispetto delle indicazioni di etichetta.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617