

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 8 del 06.07.2018

Fase fenologica prevalente: **Pre-fioritura**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le piogge abbondanti della scorsa settimana e la disponibilità idrica che stimola la formazione di nuova vegetazione, non consentono interruzioni nella protezione da questa malattia.

È quindi indispensabile mantenere una costante copertura con prodotti a base di **Rame**.

Si rammenta il limite dei 6 Kg di rame metallo impiegabile per anno e per ettaro. A tal proposito si raccomanda di utilizzare prodotti a bassa concentrazione e basso dosaggio di Rame.

OIDIO

Trattare

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, inducono a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617