DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° **10** del **06.08.2018**

Fase fenologica prevalente: **Inizio invaiatura**

BIOLOGICO

Trattare

PERONOSPORA

Le diffuse infezioni che interessano la vegetazione neoformata, non consentono interruzioni nella protezione da questa malattia. È quindi indispensabile mantenere una costante copertura con prodotti a base di **Rame**.

Si rammenta il limite dei 6 Kg di rame metallo impiegabile per anno e per ettaro. A tal proposito si raccomanda di utilizzare prodotti a bassa concentrazione e basso dosaggio di Rame.

Non trattare

OIDIO

Nei vigneti in cui le uve hanno ormai raggiunto la fase di invaiatura, la lotta all'oidio può considerarsi conclusa. Nei restanti casi si consiglia di unire al trattamento antiperonosporico un antioidico a base di Zolfo Bagnabile.

MUFFA GRIGIA

LOTTA INDIRETTA: Si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617