

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 10 del 21.07.2020

Fase fenologica prevalente: **Chiusura grappolo**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

È ancora indispensabile mantenere la protezione contro questa malattia intervenendo con prodotti a base di **Rame**.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

In questa fase di rapido sviluppo, la vegetazione risulta estremamente sensibile all'attacco dei funghi e nello specifico del Mal Bianco. Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di Zolfo bagnabile in alternativa a trattamenti polverulenti sempre a base di Zolfo.

Nel caso si fossero intraprese strategie alternative, come specificato nei precedenti bollettini, è opportuno proseguirle nel rispetto delle indicazioni di etichetta.

MUFFA GRIGIA

Trattare

LOTTA INDIRETTA: Si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale sfogliatura.

LOTTA DIRETTA: per le varietà sensibili collocate in areali particolarmente predisponenti la malattia, si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di **Eugenolo, Geraniolo e Timolo (3Logy)** oppure **Bacillus amiloliquefaciens (Taegro)**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI