

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 5 del 26.05.2020

Fase fenologica prevalente: **Bottoni fiorali separati - Inizio fioritura**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Dopo un avvio di stagione caratterizzato da frequenti precipitazioni, le condizioni climatiche stanno via via stabilizzandosi e migliorando. La presenza sporadica dei sintomi della malattia e le abbondanti rugiade mattutine, indicano comunque la necessità di mantenere costante la protezione della vegetazione e dei grappolini. Si consiglia di trattare entro **Giovedì 28 Maggio** con prodotti a base di **Rame**.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

In questa fase di rapido sviluppo, la vegetazione risulta estremamente sensibile all'attacco dei funghi e nello specifico del Mal Bianco. Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

Da questa stagione sono disponibili sul mercato, e costituiscono un'alternativa allo zolfo, prodotti biologici a base di *Bacillus Pumilus* commercializzato con il nome di Sonata (max. 6 trattamenti) e di *Bacillus amyloliquefaciens* noto con il nome di Taegro (max. 12 trattamenti) ed attivo sia su Oidio che su Muffa grigia. Per il loro impiego si consiglia di consultarsi col proprio tecnico.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617