DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° **11** del **19.08.2019**

Fase fenologica prevalente: **Fine invaiatura**

PERONOSPORA

Trattare

Si consiglia di mantenere le viti protette contro questa malattia impiegando prodotti a base di **Rame** indirizzando i getti prioritariamente verso la parte alta delle chiome al fine di proteggere la vegetazione nuova e più delicata.

È opportuno ricordare la restrizione che, da quest'anno, condiziona l'utilizzo del rame limitandone l'impiego a 4 chilogrammi di sostanza attiva ad ettaro e per annata agraria. In caso di difficoltà a rispettare le norme previste dal disciplinare, si consiglia di contattare il tecnico per definire strategie alternative.

OIDIO

Valutare

La malattia non è in grado di insediarsi su uve ormai invaiate e la lotta all'oidio può in questo caso considerarsi conclusa. Ove invece la malattia fosse presente e diffusa e non si volesse permettere al fungo di invadere i tessuti verdi delle viti, si consiglia di unire al trattamento antiperonosporico un antioidico a base di Zolfo Bagnabile.

MUFFA GRIGIA

Valutare

Con il trattamento consigliato nello scorso bollettino, sui vigneti e per le varietà sensibili alla malattia, è possibile considerare i grappoli ancora protetti.
Dove invece la grandinata di domenica 11 agosto ha provocato ferite sui grappoli e la vendemmia non risulta del tutto compromessa, è possibile intervenire con i prodotti specifici sotto riportati.
Nei vigneti colpiti da grandine, per ottenere comunque i risultati qualitativi sperati, si consiglia di operare la pulizia dei grappoli eliminando gli acini colpiti.
Lotta diretta: nei vigneti non ancora trattati o in quelli interessati dalla grandinata, si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di **Fludioxonil + Ciprodinil**, opp. **Fenexamide**, opp. **Fenpyrazamine**. Si ricorda che di ognuno dei precedenti prodotti o miscele di essi, è possibile effettuare un unico intervento per annata.
Si consiglia di intervenire solo sulla fascia del grappolo.

IN TUTTI I CASI PRESTTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL RISPETTO DEI TEMPI DI CARENZA SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI VITIGNI A MATURAZIONE PRECOCE

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617