

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 - 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086  
ZONA OPERATIVA di OVADA

Bollettino di difesa della vite n°8 del 03/07/2019

Fase fenologica prevalente: Chiusura grappolo

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

(D.M. del 31/5/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite")

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti, si ricorda l'obbligo di effettuare il 1° trattamento

**da Mercoledì 3 luglio a Martedì 9 Luglio**

Con uno dei seguenti principi attivi a dosi di etichetta: **Etofenprox o Tau-Fluvalinate**

ALTRI PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE			
(*) sostanze attive con azione indipendente dalla temperatura o efficaci anche con temperature elevate			
Sostanza attiva	Gruppo chimico	Ammesso Psr 14-20	Intervallo di sic (gg)
Acetamiprid	Neonicotinoidi	X	7-14
Clorpirifos metile	Fosfororganici	X	15
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	X	21
Flupyradifurone	Butenolidi	X	14
Acrinatrina	Piretroidi	X	30
Beta-ciflutrin	Piretroidi		14
Cipermetrina	Piretroidi		14
Deltametrina	Piretroidi		3-7-15
Esfenvalerate	Piretroidi		14-15
Lambda-cialotrina	Piretroidi		7-9-21
Tau-fluvalinate	Piretroidi	X	21
Zeta-cipermetrina	Piretroidi		28

**Si ricorda che NON E' PIU' POSSIBILE UTILIZZARE i prodotti contenenti THIAMETHOXAM (Actara e Luzindo) o CLORPIRIFOS ETILE (Pyrinex ecc)**

**SANZIONI: CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A 2.400,00 EURO**

*Si raccomanda di utilizzare alti volumi di acqua, rispettando le dosi ad ettaro consigliate, acidificando la soluzione ed irrorando entrambe le parti del filare.*

**Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti pronubi per cui è obbligatorio lo sfalcio completo della vegetazione sottostante prima del trattamento, in caso di fioriture spontanee, anche per le aziende che aderiscono al Bando PSR Misura 10.1.1-Impegno aggiuntivo dell'inerbimento controllato, evitando fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).**

### VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

**DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDO).**