

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA
Applicazione del Regolamento CEE PSR 10.1
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV Novembre 44 -15100 Alessandria

ZONA OPERATIVA DI OVADA
BOLLETTINO DI DIFESA GUIDATA DELLA VITE

NR. 4 DEL 08/06/2016

FASE FENOLOGICA: CAPPUCCI FIORALI SEPARATI / PRE-FIORITURA

PERONOSPORA

LO SVILUPPO VEGETATIVO RAGGIUNTO DAI TRALCI, ASSOCIATO AD UNA CONDIZIONE CLIMATICA NON ANCORA STABILIZZATA, E NONOSTANTE CONTINUI L'ASSENZA DI MANIFESTAZIONI INFETTIVE, CONSIGLIANO COMUNQUE DI MANTENERE COPERTA LA VEGETAZIONE AL FINE DI GIUNGERE AL TERMINE DELLA FIORITURA PER LA MAGGIOR PARTE DELLE VARIETA'.

TRATTARE DA GIOVEDI' 9 GIUGNO CON UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI DI COPERTURA:

RAME, METIRAM O MANCOZEB E SIMILARI, ANCHE IN ABBINAMENTO A ETIL FOSFITO DI ALLUMINIO

OIDIO

L'ANDAMENTO CLIMATICO ATTUALE MANTIENE ELEVATISSIMA LA POSSIBILITA' DI INFEZIONE. SI CONSIGLIA DI ADDIZIONARE AL TRATTAMENTO ANTIPERONOSPORICO UN ANTIODIDICO SPECIFICO (I.B.E., STROBILURINE E SIMILARI) E IN AGGIUNTA, UNO ZOLFO BAGNABILE ALLE MASSIME DOSI.(I.B.E.: PORRE ATTENZIONE ALLA LIMITAZIONE D'USO IMPOSTA DALLE NORME TECNICHE 2016). SEGUIRA' UNO SPECIFICO AVVISO PER TRATTAMENTO CON ZOLFO IN POLVERE A FINE FIORITURA.

Si ricorda che dopo un trattamento in vigneto, per la tutela della salute degli operatori, e' necessario attendere almeno 48 ore prima di svolgere operazioni colturali.

NOTA: ATTENZIONE ALLA LIMITAZIONE D'USO DEI PRINCIPI ATTIVI UTILIZZATI COME DA NORME TECNICHE 2016

PER COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI A RICEVERE DIRETTAMENTE QUESTI BOLLETTINI, SONO PREGATI DI FAR PERVENIRE IL LORO INDIRIZZO DI POSTE ELETTRONICA AI SOGGETTI SOTTO INDICATI:

**Coltivatori Diretti 0143/86268 Conf. Italiana Agricoltori 0143/835083
Unione Agricoltori 0143/86307**