PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV Novembre, 44 – 15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/52086

ZONA OPERATIVA DI OVADA
Bollettino di difesa guidata della vite

NR. 6 del 14/07/2017

FASE FENOLOGICA PREVALENTE: GRAPPOLO SERRATO

PERONOSPORA

LA FASE FENOLOGICA RAGGIUNTA E LE BREVI PIOGGIE DEI GIORNI SCORSI, CONSIGLIANO DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CAUTELATIVO CON UN PRODOTTO A BASE DI RAME.

NOTA: LIMITAZIONE D'USO MAX 6 KG/HA ANNUI

OIDIO

ADDIZZIONARE AL TRATTAMENTO LIQUIDO,UNO ZOLFO BAGNABILE ALLE MASSIME DOSI CONSIGLIATE IN ETICHETTA E SUCCESSIVAMENTE MANTENERE LA COPERTURA UTILIZZANDO ZOLFO IN POLVERE

NEL CASO SI DECIDESSE DI NON EFFETTUARE IL TRATTAMENTO ANTIPERONOSPORICO, VISTA LA PRESSIONE DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UNA SOLFORAZIONE (ZOLFO IN POLVERE) NELLE ORE PIU' FRESCHE DELLA GIORNATA, AL FINE DI EVITARE USTIONI, ALLA DOSE DI 25 KG/HA.

AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLE API (L. R. 3/8/98 n. 20) **E' VIETATO IL TRATTAMENTO CON INSETTICIDI SU COLTURE IN FIORITURA.**

Deve essere anche evitata la presenza di fioriture spontanee nella vegetazione sottostante **che va sfalciata e asportata o fatta appassire in modo da non risultare più attrattiva per le api.**

trattare con volumi di acqua elevati (10 hl / Ha)/ intervenire anche negli impianti non ancora in produzione
intervenire su entrambi i lati dei filari bagnando bene tutta la vegetazione
trattare nelle ore più fresche della giornata ed in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.