

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

**Applicazione del Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria**

ZONA OPERATIVA DI OVADA

BOLLETTINO DI DIFESA GUIDATA DELLA VITE NR. 7 EMESSO IL 26/06/2019

FASE FENOLOGICA PREVALENTE: grano di pepe (BBCH 75)

PERONOSPORA

LE MODESTE PRECIPITAZIONI DI SABATO POMERIGGIO HANNO DATO ORIGINE AD UNA BAGNATURA FOGLIARE DI MOLTE ORE CHE POTREBBE PROVOCARE, NEI VIGNETI PRIVI DI COPERTURA ANTIPERONOSPORICA, UNO SVILUPPO DI INFEZIONI SECONDARIE. CONSIDERANDO LA DISTANZA TEMPORALE DALL'ULTIMO TRATTAMENTO CONSIGLIATO, E' NECESSARIO PROTEGGERE ANCHE LA NUOVA VEGETAZIONE CON UN TRATTAMENTO ANTIPERONOSPORICO DI COPERTURA A BASE DI :

RAME METALLO

LIMITE RAME S.A. PER 2019: (MAX 28 KG/HA ANNO DI S.A. PER I PROX 7 ANNI , MEDIA ANNUALE CONSIGLIATA 4 KG/HA ANNO)

OIDIO

LE CONDIZIONI CLIMATICHE, CARATTERIZZATE DA ELEVATE TEMPERATURE MA CON UN'ALTA PERCENTUALE DI UMIDITA' RELATIVA , SONO MOLTO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL FUNGO.

SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI ABBINARE AL TRATTAMENTO **ZOLFO BAGNABILE COLLOIDALE** ALLE MASSIME DOSI CONSIGLIATE IN ETICHETTA.

SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, RIPETERE L'INTERVENTO CON **ZOLFO IN POLVERE** , PONENDO L'ACCORTEZZA D' INTERVENIRE A VEGETAZIONE ASCIUTTA EVITANDO LE ORE PIU' CALDE DELLA GIORNATA AL FINE DI NON PROVOCARE POSSIBILI USTIONI AL GRAPPOLO IN FORMAZIONE.

IN CASO DI FORTI INFEZIONI , CONSULTARE IL SERVIZIO TECNICO.

SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.

**Coltivatori Diretti 0144/322546
Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083
Unione Agricoltori 0144/322243**