PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV Novembre, 44 – 15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/52086

ZONA OPERATIVA DI OVADA

BOLLETTINO VITE NR. 7 del 26 LUGLIO

FASE FENOLOGICA PREVALENTE: INVAIATURA

FLAVESCENZA DORATA

VEDI ALLEGATO

PERONOSPORA

A SEGUITO DELL'EVENTO TEMPORALESCO DEL 24, SI CONSIGLIA DI ADDIZIONARE ALL'INSETTICIDA, UN PRODOTTO A BASE DI SALI DI RAME. NOTA: SE NON INTERVERRANNO CONDIZIONI METEO PARTICOLARI,VISTO L'ANTICIPO FENOLOGICO RAGGIUNTO, SI CONSIDERA QUESTO COME TRATTAMENTO ANTIPERONOSPORICO DI CHIUSURA.

NOTA: LIMITAZIONE D'USO MAX 6 KG/HA ANNUI

OIDIO

CONSIDERANDO L'ELEVATA PRESSIONE DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON ZOLFO BAGNABILE ALLA MAX. DOSE IN ETICHETTA, TRATTANDO NELLE ORE PIU' FRESCHE PER EVITARE FENOMENI DI FITOTOSSICITA'. PER UNA MAGGIORE PERSISTENZA D'AZIONE, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE CYFLUFENAMID ALLA DOSE DI 0,5 LT/HA

Deve essere anche evitata la presenza di fioriture spontanee nella vegetazione sottostante **che va sfalciata e asportata o fatta appassire in modo da non risultare più attrattiva per le api.**

trattare con volumi di acqua elevati (10 hl / Ha)/ intervenire anche negli impianti non ancora in produzione intervenire su entrambi i lati dei filari bagnando bene tutta la vegetazione
trattare nelle ore più fresche della giornata ed in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Coltivatori Diretti 0143/86268 Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083 Unione Agricoltori 0143/86307