

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento CEE PSR 214
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV Novembre 44 -15100 Alessandria

ZONA OPERATIVA DI OVADA

BOLLETTINO DI DIFESA GUIDATA DELLA VITE

NR. 3 DEL 27/05/2015

FASE FENOLOGICA: INIZIO FIORITURA

PERONOSPORA

LE PIOGGIE DEI GIORNI SCORSI, LA FASE FENOLOGICA PARTICOLARMENTE RECETTIVA NEI CONFRONTI DEL PATOGENO, ASSOCIATO AD UNA CONDIZIONE CLIMATICA NON ANCORA STABILIZZATA, CONSIGLIANO DI MANTENERE COPERTA LA VEGETAZIONE CON UN PRODOTTO PERSISTENTE CHE PERMETTA DI ARRIVARE IN PROSSIMITA' DELLA FINE FIORITURA PER LA MAGGIOR PARTE DELLE VARIETA'.

TRATTARE ENTRO SABATO 30 MAGGIO CON UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI:

- **ZOXAMIDE + PRODOTTO COPERTURA**
- **FLUOPICOLIDE + PHOSETIL ALLUMINIO + PRODOTTO COPERTURA**
- **DIMETOMORF + PRODOTTO COPERTURA**
- **IPROVALICARB + PRODOTTO COPERTURA E SIMILARI**
- **MANDIPROPAMID + PRODOTTO COPERTURA**

OIDIO

CONSIDERANDO L'ELEVATA PERICOLOSITA' IN QUESTA FASE SI CONSIGLIA DI ADDIZIONARE AL TRATTAMENTO ANTIPERONOSPORICO UN ANTIROIDICO SPECIFICO (I.B.E., TRIFLOXISTOBIN, METRAFENONE E SIMILARI) O, IN ALTERNATIVA, UNO ZOLFO BAGNABILE ALLE MASSIME DOSI CONSENTITE IN ETICHETTA. SEGUIRA' UNO SPECIFICO TRATTAMENTO CON ZOLFO IN POLVERE A FINE FIORITURA.

Si ricorda che dopo un trattamento in vigneto, per la tutela della salute degli operatori, e' necessario attendere almeno 48 ore prima di svolgere operazioni colturali.

NOTA: PORRE ATTENZIONE INOLTRE ALLA LIMITAZIONE D'USO DEI PRINCIPI ATTIVI UTILIZZATI COME DA NORME TECNICHE 2015

PER COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI A RICEVERE DIRETTAMENTE QUESTI BOLLETTINI, SONO PREGATI DI FAR PERVENIRE IL LORO INDIRIZZO DI POSTE ELETTRONICA AI SOGGETTI SOTTO INDICATI:

**Coltivatori Diretti 0143/86268 Conf. Italiana Agricoltori 0143/835083
Unione Agricoltori 0143/86307 Cantina Tre Castelli 0143/85136**