

ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite
N° 07 del 10/07/2012

PERONOSPORA

Considerate le bagnature fogliari, si consiglia di mantenere la copertura nei vigneti in special modo dove sono presenti rugiate mattutine con prodotti a base di:

**- RAME - IDROSSIDO DI RAME - OSSICLORURO DI RAME -
POLTIGLIA BORDOLESE**

OIDIO

Considerata la presenza di sintomi della malattia presente sui grappoli nei vigneti si consiglia di effettuare un trattamento con **zolfo in polvere** alla dose di **25-30 kg/Ha**

Nei casi dove si rileva la malattia manifesta attacchi su grappolo, abbinare al trattamento un prodotto sistemico o I.B.E. rispettando gli intervalli previsti in etichetta e rispettando comunque il numero massimo di interventi per il principio attivo.

METRAFENONE
QUINOXIFEN
SPIROXAMINA
AZOXYSTROBIN

PYRACLOSTROBIN
TRIFLOXISTEOBIN
BOSCALID (1 intervento/anno)

Per gli altri P.A. sono ammessi al massimo 3 trattamenti stagionali

NEI CASI DI FORTE ATTACCO DELLA MALATTIA SI CONSIGLIA DI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI CULTURALI.