

# PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

COMITATO DI CORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE  
COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV Novembre, 44 – 15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/52086

## ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite N° 05 del 18/06/2012

### PERONOSPORA

A seguito delle piogge avvenute nella seconda settimana di Giugno, e le umidità del mattino; sono le condizioni ideali allo sviluppo della malattia. Si consiglia di mantenere la copertura e d'intervenire al suono del segnale acustico con prodotti di copertura a base di **RAME** entro la giornata di Lunedì 18/06 al suono della campana

### OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico uno **ZOLFO BAGNABILE**, in alternativa, in condizioni di tempo stabile effettuare un trattamento utilizzando dello **ZOLFO IN POLVERE** (alla dose di 30 kg/Ha).  
Linea sistemici: ripetere il trattamento a scadenza del prodotto utilizzato.

### FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

#### **SOLO PER LE AZIENDE BIOLOGICHE**

**I TRATTAMENTI CON PIRETRO SONO EFFICACI SOLO SUI GIOVANI E QUINDI DEVONO ESSERE ESEGUITI PRIMA DELLE ALTRE AZIENDE**

**SE LA FIORITURA NEL PROPRIO VIGNETO E' TERMINATA, NEL PERIODO 15-17 GIUGNO TRATTARE CON **PIRETRO****

**Più efficace se addizionato con piperonil butossido.**

Trattare la sera tardi, usare acque non calcaree o acidificare la soluzione (pH < 7).

**RIPETERE I TRATTAMENTI CON PIRETRO ALTRE 2 VOLTE A DISTANZA DI 7-10 GIORNI FRA UN TRATTAMENTO E L'ALTRO SENZA ATTENDERE ALTRI COMUNICATI**

#### **PER LE ALTRE AZIENDE CONVENZIONALI O IN PRODUZIONE INTEGRATA**

(che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013)

### **NON E' ANCORA IL MOMENTO DI TRATTARE**

**IL MOMENTO GIUSTO PER IL PRIMO TRATTAMENTO INSETTICIDA SARA' INDICATO CON APPOSITO BOLLETTINO DALL'ASSISTENZA TECNICA O DAI COMUNI**

**ATTENZIONE!!! E' INUTILE TRATTARE PRIMA**

In tutti i casi e' importante: controllare il pH della soluzione poiché la maggior parte degli insetticidi necessitano di un ambiente acido o sub acido (pH<6.5-6) per esplicare la loro azione.

Si ricorda che ai fini della salvaguardia delle api ( L. R. 3/8/98 n. 20 ) il trattamento insetticida deve essere effettuato solo dopo la fine del periodo di fioritura della vite, quindi ad allegagione avvenuta, previa l'eliminazione, tramite sfalcio e appassimento o asportazione, di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.

**SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.**

Ufficio Condifesa ( bollettino telefonico ) : Tel.-0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546 - Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : [www.regione.piemonte.it/agri](http://www.regione.piemonte.it/agri)