

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE - TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2014

In seguito alle osservazioni effettuate negli ultimi giorni, inerenti alle catture di Scafoideo sulle trappole cromotattiche e all'evoluzione del ciclo dell'insetto, si ritiene necessario effettuare un

TERZO TRATTAMENTO INSETTICIDA

con l'obiettivo di abbattere la presenza degli adulti e limitare le possibili ovodeposizioni, osservando scrupolosamente le seguenti **prescrizioni**:

- **VIGNETI IN CUI LA VENDEMMIA E' CONCLUSA E NUOVI IMPIANTI (1°/2° ANNO): UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI CLORPIRIFOS ETILE (preferibilmente nella formulazione in granuli idrodispersibili)**
- **VIGNETI IN CUI LA VENDEMMIA DEVE ANCORA ESSERE EFFETTUATA: UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI DELTAMETRINA**

PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE A :

- **RISPETTARE LE INDICAZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA, IL PERIODO DI CARENZA, LE LIMITAZIONI DI *IMPORT TOLERANCE***
- **PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE IL FENOMENO DELLA DERIVA (non trattare in presenza di vento)**
 - **NON TRATTARE IN PRESENZA DI INSETTI PRONUBI (API)**
 - (Legge regionale 03/08/1998 per la Salvaguardia degli insetti pronubi)
 - **Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7**
 - **Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione**
 - **Trattare tutti i filari da entrambi i lati**
 - **Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.**
 - **Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.**

DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).