

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV Novembre, 44 – 15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/52086

ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite - N° 8 del 30/07/2012

SCAPHOIDEUS T.

VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA

Dai controlli effettuati nei vigneti, dai rilievi effettuati sulle trappole cromotattiche, in considerazione che il volo degli adulti è iniziato, specialmente nei vigneti, in prossimità di incolti e vigneti abbandonati (aree ove l'insetto trova habitat idoneo al ripopolamento), visto il numero delle piante che presentano sintomi riconducibili alla Flavescenza dorata, si ritiene opportuno **effettuare il trattamento dal 30 luglio al 5 agosto 2012** contro lo *Scaphoideus titanus*. Le piante malate da Flavescenza Dorata vanno tagliate ed estirpate. Non utilizzare lo stesso principio attivo del primo trattamento.

Nei vigneti di **Chardonnay, Pinot Nero e Moscato** precoci è consigliato l'utilizzo di **Clorpirifos Metile** (15 gg di Carenza) o **etofenprox** (14 gg di carenza);

nei vigneti di **Moscato a maturazione media e tardivi e Brachetto** è preferibile utilizzare **Actara** (maggiore persistenza);

nei vigneti di **Dolcetto, Cortese e Barbera** sarà possibile utilizzare **clorpirifos Metile** (15 gg di carenza)e/o **etofenprox** (14gg di carenza) e/o **Actara** (21 gg di carenza).

Operare anche sui bordi specialmente in presenza di vite selvatica e ribatterli.

È FONDAMENTALE IL TRATTAMENTO PER COMPENSORIO NEGLI STESSI GIORNI PER OTTENERE UN MIGLIOR RISULTATO, QUINDI NON ANTICIPARE O RITARDARE IL TRATTAMENTO;

-si deve trattare molto bene anche il vitigno moscato, in quanto la sensibilità è la stessa degli altri vitigni;

- rispettare scrupolosamente i tempi d'intervento ed i dosaggi indicati in etichetta;

- impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;

- cercare di far pervenire la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni;

- evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi;

-eliminare, tramite sfalcio e appassimento o asportazione, eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti;

- il trattamento deve, inoltre, essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva;

-l'estirpo delle viti malate ed i trattamenti insetticidi sono obbligatori;

-usare acque non calcaree o acidificare la soluzione (pH < 7);

- si ricorda che il settore Fitosanitario Regionale effettuerà dei controlli a campione sull'effettuazione dei trattamenti.

PERONOSPORA

Viste le precipitazioni e le bagnature dei giorni scorsi si consiglia di mantenere la copertura nel vigneto al suono del segnale acustico, effettuando un trattamento entro lunedì 30 luglio con prodotti a base di **RAME**.

OIDIO

Nei casi e nei vigneti dove risultino presenza di sintomi diffusi del patogeno prima di intervenire con prodotti di difesa è opportuno verificare l'entità del danno ed in caso contattare i servizi tecnici.

ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA!!!!!!!

CON L'APPROSSIMARSI DELLA VENDEMMIA I TRATTAMENTI EFFETTUATI IN QUESTI PERIODI RISCHIANO DI SUPERARE I TEMPI MINIMI DI CARENZA PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE UVE.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI PRODOTTI UTILIZZATI PRIMA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Confagricoltura: Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri