PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV Novembre, 44 – 15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/52086

ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite - N° 12 FD del 30/07/2013

SCAPHOIDEUS T.

VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA

Dai controlli effettuati nei vigneti, dai rilievi effettuati sulle trappole cromotattiche, in considerazione che il volo degli adulti è iniziato, specialmente nei vigneti in prossimità di incolti e vigneti abbandonati (aree dove l'insetto trova habitat idoneo al ripopolamento), visto il numero delle piante che presentano sintomi riconducibili alla Flavescenza dorata, si ritiene opportuno effettuare il trattamento dal 30 luglio al 4 agosto 2013 contro lo Scaphoideus titanus.

Nei vigneti di Moscato e Brachetto è preferibile utilizzare Actara (maggiore persistenza); nei vigneti di Chardonnay, Pinot Nero, Dolcetto, Cortese e Barbera sarà possibile utilizzare: clorpirifos Metile (15 gg di carenza)e/o etofenprox (14gg di carenza) e/o Actara (21 gg di carenza).

Non è possibile utilizzare lo stesso principio attivo utilizzato nel primo trattamento.
I prodotti contenenti clorpirifos etile possono essere utilizzati fino al 30 luglio 2013.

- è fondamentale il trattamento per comprensorio negli stessi giorni per ottenere un miglior risultato, quindi non anticipare o ritardare il trattamento;
- si deve trattare molto bene anche il vitigno moscato, in quanto la sensibilità è la stessa degli altri vitigni;
- rispettare scrupolosamente i tempi d'intervento ed i dosaggi indicati in etichetta;
- impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- cercare di far pervenire la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni;
- evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi;
- eliminare, tramite sfalcio e appassimento o asportazione, eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti;
- il trattamento deve, inoltre, essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva;
- devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata di metcalfa nei mesi di luglio e agosto;
- nel caso di presenza di metcalfa, per evitare apicidi, è utile effettuare in precedenza un trattamento con sali potassici per il lavaggio della melata;
- l'estirpo delle viti malate ed i trattamenti insetticidi sono obbligatori;
- usare acque non calcaree o acidificare la soluzione (pH < 7);
- si ricorda che il settore Fitosanitario Regionale effettuerà dei controlli a campione sull'effettuazione dei trattamenti.

PERONOSPORA

Viste le precipitazione e le bagnature dei giorni scorsi si consiglia di mantenere la copertura nel vigneto effettuando un trattamento o con prodotti a base di **RAME**.

OIDIO

Nei casi e nei vigneti dove risultino presenza di sintomi diffusi del patogeno prima di intervenire con prodotti di difesa è opportuno verificare l'entità del danno ed in caso contattare i servizi tecnici.

Si raccomanda:

° LA CORRETTA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E UTILIZZARE LE DOSI INDICATE IN ETICHETTA
° DI REGISTRARE SUL QUADERNI DI CAMPAGNA I TRATTAMENTI ESEGUITI
° DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.
SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144 / 356582
Coldiretti : Tel. 0144 / 322546
Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272
Confagricoltura: Tel. 0144 / 322243
Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri