

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/07

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 6 del 21.06.2012

Fase fenologica prevalente: Allegagione – Prechiusura grappolo

Peronospora

La situazione fitosanitaria si presenta difforme con presenza, in alcuni areali, di macchie d'olio e grappolini colpiti. Le temperature non sono sempre in grado di bloccare le eventuali infezioni in corso e l'elevata umidità favorisce la formazione di rugiade anche abbondanti.

Si consiglia pertanto di mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di:

Zoxamide + Rame

Opp.

Fosetyl Al + Rame.

Opp.

Fosetyl Al + Fenamidone

Oidio

La pericolosità della malattia in questo momento e l'attuale fase fenologica, impongono una difesa antioidica basata sulla presenza di prodotti specifici ed estremamente efficaci. Si consiglia quindi di intervenire successivamente all'intervento antiperonosporico, con **Zolfo in polvere**. In alternativa è possibile unire alla miscela un formulato a base di **Quinoxifen** o **Metrafenone**. In caso di infezioni di oidio in corso si consiglia di contattare i servizi tecnici per stabilire strategie alternative.

Muffa Grigia

A causa dell'andamento climatico delle ultime settimane, la malattia risulta essere quest'anno, estremamente pericolosa. La difesa dovrà quindi avvalersi dei benefici apportati sia dalla lotta fisica ed agronomica indiretta che di quella chimica diretta.

Lotta indiretta: si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde.

Lotta diretta: per le varietà sensibili che abbiano già raggiunto la fase fenologica di prechiusura del grappolo, si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di **Pirimetani**, opp. **Fludioxonil** + **Ciprodinil**, opp. **Fenexamide**, opp. **Boscalid**.

Si ricorda che l'intervento antibotritico deve essere effettuato puntando i getti direttamente sull'uva e trattando entrambi i lati del filari.

"Il presente Bollettino è elaborato sulla base di analisi agrometeorologiche, fenologiche e fitosanitarie eseguite sui territori a vigneto dei **Comuni aderenti alla Convenzione per la difesa e la tutela delle produzioni agricole dell'area Casalese** e ne è vietata la diffusione in altri Comuni non convenzionati.

Il Comitato di coordinamento fitosanitario della provincia di Alessandria declina ogni responsabilità per la diffusione non autorizzata delle presenti informazioni tecniche al di fuori dei Comuni convenzionati."

Coldiretti Casale M.to 0142 452840

Coldiretti Cerrina 0142 943800

Confagricoltura Alessandria 0142 452209

Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617