

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CEE 1698/2005
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA: GAVI

Bollettino di difesa guidata della vite

n. 1 del 04/05/2012

Fase fenologica prevalente: da inizio germogliamento a germogli di 15 cm.

ANDAMENTO CLIMATICO

La consueta instabilità climatica primaverile e le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, descrivono un periodo caratterizzato da piogge diffuse anche se di ridotta intensità.

PERONOSPORA

Le indicazioni fornite dai modelli previsionali riguardanti le infezioni peronosporiche, indicano un limitato livello di pericolosità della malattia. Nonostante ciò lo sviluppo ormai raggiunto in alcuni vigneti dalla vegetazione, lo stabilizzarsi delle temperature e l'instabilità meteorologica prevista, consigliano di effettuare un trattamento specifico.

Si raccomanda quindi di intervenire a partire da lunedì 7 maggio con uno dei seguenti principi attivi:

Cymoxanil + prodotto di copertura

Opp.

Dimetomorf + prodotto di copertura

Si rammenta che da quest'anno i prodotti contenenti Mancozeb possono essere impiegati complessivamente per un massimo di tre interventi. In alternativa è possibile utilizzare formulazioni contenenti rame o sostituire al Mancozeb il Metiram o il Propineb effettuando quindi miscele estemporanee dei singoli principi attivi.

OIDIO

Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di Zolfo Bagnabile. In vigneti siti in aree tradizionalmente sensibili alla malattia o in caso di forti infestazioni nella scorsa campagna, si consiglia di sostituire lo zolfo con meptyl-dinocap.

Si ricorda che il Reg. ce 1698/2005 prevede l'utilizzo di prodotti aventi classe tossicologica più bassa. Per ulteriori informazioni contattare il proprio tecnico .

Coldiretti
Novi Ligure
0143/75440

UPA
Novi Ligure
0143/2633

CIA
Novi Ligure
0143/72176