

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CEE 1698/2005
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA: GAVI

bollettino di difesa guidata della vite

n° 10 del 09.08.2012

Fase fenologica prevalente: inizio invaiatura

PERONOSPORA

Si consiglia di mantenere protetta la vegetazione trattando **entro questa settimana** con una delle seguenti miscele:

Fosetil Al + Rame opp

Fosetil Al + Fenamidone

Si ricorda che le strobilurine (Fenamidone, ecc.) possono essere impiegate complessivamente tre volte.

OIDIO

Dove l'invaiatura non è ancora avvenuta, si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

MUFFA GRIGIA

LOTTA INDIRECTA: Si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde.

LOTTA DIRETTA: Per le varietà sensibili si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di FENEXAMID, opp. FLUAZINAM, opp. BOSCALID, opp. PIRIMETANIL, opp. FLUDIOXONIL + CIPRODINIL.

Si ricorda che non è possibile ripetere lo stesso principio attivo già eventualmente utilizzato e che i prodotti a base di Pirimetanil (Scala) e Fludioxonil + Ciprodinil (Switch) possono essere usati un'unica volta complessivamente.