

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CEE 1698/2005
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA: Gaviese - Novese

bollettino di difesa guidata della vite

n° 13 del 12.08.2013

Fase fenologica prevalente: inizio invaiatura

PERONOSPORA

Considerate le recenti precipitazioni piovose e l'instabilità meteorologica prevista per i prossimi giorni, si consiglia di mantenere protetta la vegetazione trattando **entro questa settimana** con prodotti a base di **RAME**.

(OSSICLORURO DI RAME, POLTIGLIA BORDOLESE, IDROSSIDO DI RAME,)

OIDIO

Dove l'invasione non è ancora avvenuta, si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

MUFFA GRIGIA

LOTTA INDIRETTA: Si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde.

LOTTA DIRETTA: Per le varietà sensibili si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di FENEXAMIDE, opp. FLUAZINAM, opp. BOSCALID, opp. PIRIMETANIL, opp. FLUDIOXONIL + CIPRODINIL.

Si ricorda che non è possibile ripetere lo stesso principio attivo già eventualmente utilizzato e che i prodotti a base di Pirimetanil (Scala) e Fludioxonil + Ciprodinil (Switch) possono essere usati un'unica volta complessivamente.