

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CEE 1698/2005

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA: GAVI

Bollettino di difesa guidata della vite

n. 4 del 11/06/2012

Fase fenologica prevalente: fioritura

PERONOSPORA

In relazione ad un andamento climatico ancora non completamente assestatosi ed a temperature insufficienti a bloccare naturalmente le infezioni peronosporiche, si consiglia di intervenire ovunque con una delle seguenti miscele proposte:

Dimetomorf + Mancozeb

Iprovalicarb + Fosetil Al + Fenamidone

Ciazofamid + Mancozeb

Metalaxyl M + Mancozeb

Da questo trattamento si consiglia di trattare entrambi i lati del filare.

Si rammenta che da quest'anno i prodotti contenenti Mancozeb possono essere impiegati complessivamente per un massimo di tre interventi. In alternativa è possibile utilizzare formulazioni contenenti rame o sostituire al Mancozeb il Metiram o il Propineb effettuando quindi miscele estemporanee dei singoli principi attivi.

OIDIO

Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico sistemico (I.B.E.).

Si ricorda che il Reg. ce 1257/99 prevede l'utilizzo di prodotti aventi classe tossicologica più bassa. Per ulteriori informazioni contattare il proprio tecnico .

Coldiretti
Novi Ligure
0143/75440

Confagricoltura
Novi Ligure
0143/2633

CIA
Novi Ligure
0143/72176