

# PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/07  
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA  
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA : Gavi

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 7 del 09.07.2012

Fase fenologica prevalente: Prechiusura grappolo

## Peronospora

La situazione fitosanitaria si presenta difforme con presenza, in alcuni areali, di macchie d'olio e grappolini colpiti. Le temperature non sono sempre in grado di bloccare le eventuali infezioni in corso e l'elevata umidità favorisce la formazione di rugiade anche abbondanti.

Si consiglia pertanto di mantenere protetta la vegetazione con prodotti a base di:

Zoxamide + Rame

Opp.

Fosetyl Al + Rame.

Opp.

Fosetyl Al + Fenamidone

## Oidio

La pericolosità della malattia in questo momento e l'attuale fase fenologica, impongono una difesa antioidica basata sulla presenza di prodotti specifici ed estremamente efficaci. Si consiglia quindi di intervenire successivamente all'intervento antiperonosporico, con Zolfo in polvere. In alternativa è possibile unire alla miscela un formulato a base di Quinoxifen o Metrafenone. In caso di infezioni di oidio in corso si consiglia di contattare i servizi tecnici per stabilire strategie alternative.

## Muffa Grigia

A causa dell'andamento climatico delle ultime settimane, la malattia risulta essere quest'anno, estremamente pericolosa. La difesa dovrà quindi avvalersi dei benefici apportati sia dalla lotta fisica ed agronomica indiretta che di quella chimica diretta.

Lotta indiretta: si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale potatura verde. Lotta diretta: per le varietà sensibili che abbiano già raggiunto la fase fenologica di prechiusura del grappolo, si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di Pirimetanil, opp. Fludioxonil +Ciprodinil, opp. Fenexamide, opp. Boscalid.

Si ricorda che l'intervento antibiotritico deve essere effettuato puntando i getti direttamente sull'uva e trattando entrambi i lati del filari.

**Si ricorda che il Reg. ce 1257/99 prevede l'utilizzo di prodotti aventi classe tossicologica più bassa. Per ulteriori informazioni contattare il proprio tecnico .**