

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/07

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA : GAVI

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 8 del 20.07.2012

Fase fenologica prevalente: Chiusura grappolo

PERONOSPORA

Considerate le precipitazioni dello scorso fine settimana e quelle previste per il prossimo, la presenza di macchie d'olio di precedenti attacchi e le temperature che di notte scendono al di sotto dei valori oltre i quali la malattia è bloccata, favoriscono l'instaurarsi di nuove infezioni peronosporiche soprattutto a carico della nuova vegetazione. In queste condizioni ed in questa fase fenologica, è importante mantenere protetta la vegetazione utilizzando una delle seguenti miscele e trattando entrambi i lati del filare:

Zoxamide + Rame

Mandipropamid + Rame

Fosetil Al + Rame

Fosetil Al + Fenamidone

Si ricorda che Dimetomorf, Iprovalicarb e Mandipropamid possono essere impiegati complessivamente quattro volte.

OIDIO

Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di Quinoxifen o Metrafenone e successivamente di intervenire con **Zolfo** in **Polvere**. In caso di infezioni in atto si consiglia di contattare preventivamente il proprio tecnico.

Si ricorda che entrambi i principi attivi possono essere utilizzati per un massimo di tre volte ciascuno.

COLDIRETTI
NOVI LIGURE
0143/75440

CONFAGRICOLTURA
NOVI LIGURE
0143/2633

CIA
NOVI LIGURE
0143/72176

